

PSIHIJARIJA

1. **Povećan indeks karijesa je posledica kod psihijatrijskih bolesnika: uticaja lekova na sušenje sluzokože usne duplje, uticaja afekta na sušenje usne duplje, nedostatak higijene:**
 - a. da
 - b. ne

2. **Fantomski zub je posledica neprihvatanjaa normalnog procesa starenja:**
 - a. da
 - b. ne

3. **Paranoidni tip shizofrenije se obično javlja u četvrtoj deceniji života:**
 - a. da
 - b. ne

4. **Kod simpleks tipa shizofrenije osnovni simptom je povlačenje iz socijalnih i profesionalnih aktivnosti:**
 - a. da
 - b. ne

5. **Navedi bar dva oblika poremećaja ličnosti:**

6. **Da li osobe sa poremećajem ličnosti razvijaju osećaj krivicei kajanja kada pogreše?**
 - a. da
 - b. ne

7. **Kvalitativni poremećaji svesti su delirijum, somnabulizam:**
 - a. da
 - b. ne

8. **Hipobulija i abulija su (zaokruži tačan odgovor):**
 - a. poremećaj volje
 - b. poremećaj svesti

9. **Hipertimija se javlja kao (zaokruži tačan odgovor):**

- a. depresija
- b. manije
- c. bulizam

10. Afekat je kratkotrajno, intenzivno emocionalno stanje:

- a. da
- b. ne

11. Poremećaji pamćenja su: amnezije, konfabulacije:

- a. da
- b. ne

12. Sadržajni poremećaji mišljenja su (zaokruži tačan odgovor)

- a. prisilni fenomeni
- b. precenjene ideje
- c. sumanute ideje

13. Koja je vrednost IQ (količnik inteligencije) kod prosečno inteligentnih?

14. Demencije su stečeni poremećaji inteligencije:

- a. da
- b. ne

15. Nabrojte bar jednu psihijatrijsku bolest sa hipertencijom pažnje:

16. Histrionični tipovi poremećaja ličnosti su (zaokruži tačan odgovor):

- a. nametljivi
- b. stidljivi

17. Bruksizam se manifestuje kao (zaokruži tačan odgovor):

- a. nevoljno škr gutanje i stezanje zuba
- b. bol u gornjoj vilici

18. Glosodynia se javlja (zaokruži tačan odgovor):

- a. kod mlađih
- b. kod srednjih i starijih godina

19. Protetska stomatopatija se javlja kod (zaokruži tačan odgovor):

- a. preosetljivih i depresivnih osoba
- b. kod maničnih osoba

20. Nabrojite bar tri razloga povećanja karijes-indexa kod psihijatrijskih bolesnika:

21. Atipični facijalni bol je simptom (zaokruži tačan odgovor):

- a. depresije
- b. prisutnog karijesa

22. Stomatolog mora da bude (zaokruži tačan odgovor):

- a. pažljiv
- b. samo da radi svoj posao

23. Navedite bar dva oblika shizofrenije:

24. Zašto se shizofrenija simpleks naziva i šunjajuća forma bolesti?

25. Razvoje inteligencije zavisi od:

- a. nasleđa
- b. sredine u kojoj se dete razvija

26. Demencije su:

- a. urođeni poremećaj inteligencije
- b. stečeni poremećaj inteligencije

27. Nabroj dva oblika karakter neuroza (psihopatija):

- a. _____
- b. _____

28. Sumanute ideje spadaju u poremećaje mišljenja po sadržaju:

- a. da

b. ne

29. Shizofrenija simplex naziva se još i šunjajuća bolest:

- a. da
- b. ne

30. Nabrojte bar dva razloga nastanka stomatoloških bolesti kod psihoza::

- a. _____
- b. _____

31. Neuroleptici izazivaju „medikamentozni parkinsonizam“:

- a. da
- b. ne

32. Hipertimije su:

- a. depresija
- b. manija

33. Nabroj dva oblika stomatodinija:

- a. _____
- b. _____

34. Ambivalencija je poremećaj:

- a. volje
- b. mišljenja
- c. percepcije

35. Poremećaji opažanja su (zaokruži tačne odgovore):

- a. agnozije
- b. iluzije
- c. halucinacije

36. Kod halucinacija postoje (zaokruži tačne odgovore):

- a. karakter telesnosti
- b. pozitivan sud realnosti
- c. javljaju se samo u komi

37. Od kojih faktora zavisi razvoj inteligencije (zaokruži tačan odgovor)?

- a. nasleđa
- b. uticaja spoljne sredine
- c. telesne visine

38. Kvalitativni poremećaji svesti su (navedi tačne odgovore):

- a. _____
- b. _____
- c. _____

39. Nabrojte bar dve vrste fobija:

40. Nabrojte bar dva oblika poremećaja ličnosti (psihopatija):

41. Nabrojte bar dva oblika shizofrenije:

42. Nabrojte tri različita uzroka učestalosti pojave karijesa kod psihotičnih bolesnika:

43. Koji je pogrešan stomatološki terapijski postupak primenjen kod atipičnog facijalnog bola?

44. Šta je to fantomski zub?

45. Usmerenost deteta na svoje telo, naročito ruke, njihovo razgledanje karaktersitični su za :

- a. Autizam
- b. Depresiju

c. Shizofreniju

46. Osobine pažnje su (zaokruži tačne odgovore):

- a. Tenacitet
- b. Vigilnost
- c. Asocijativnost

47. Bulimija je poremećaj:

- a. Spavanja
- b. Ishrane
- c. Mokrenja

48. Navedi bar pet psihičkih funkcija:

- A
- B
- C
- D
- E

49. Navedi podelu poremećaja mišljenja:

50. Sumanute ideje predstavljaju poremećaj:

- a. Formalni poremećaj mišljenja
- b. Sadržajni poremećaj mišljenja
- c. Prisilne fenomene

51. Navedi bar tri oboljenja ili stanja CNS-a koji mogu da dovedu do akutnog moždanog sindroma (AMS):

- a.
- b.
- c.

52. Sistematizovane sumanute ideje, gde postoji čvrst ideo-afektivni blok, bolesnik se ne da razuveriti karakteristike su

- a. Paroničnog sumanutog sindroma
- b. Paranoidnog sumanutog sindroma

53. Za Alchajmerovu bolest tipične su patohistološke promene zaokruži tačen odgovore):

- a. Senilni plakovi
- b. Neurofibrilarne petlje
- c. Hirano telašca

54. Lako menjanje raspoloženja, od plača do smeha, bez povoda naziva se:

- a. Emocionalna inkontinencija
- b. Euforija

55. Apstencijalni sindrom je izuzetno težak kod uživalaca:

- a. Paramimija
- b. Halucinogena
- c. Kanabisa
- d. Psihostimulansa

56. Navedi bar tri grupe psihotropnih lekova:

- a.
- b.
- c.

57. Koji od navedenih medikamenata predstavljaju osnovnu terapiju shizofrenije:

- a. Klasični atipični antipsihotici
- b. Antidepresivi
- c. Sedativi
- d. Psihostabilizatori

58. Podozrivost, netrpeljivost i smunjivost karakteristike su:

- a. Shizoidnog poremećaja ličnosti
- b. Zavisnog poremećaja ličnosti
- c. Paranoidnog poremećaja ličnosti
- d. Histrioničnog poremećaja ličnosti

59. Bolesti zuba se mogu ibrojati u psihosomatske poremećaje:

- a. Posredno
- b. neposredno

60. Najteži kvantitativni poremećaj svesti je:

- a. Sopor
- b. Koma
- c. Fuga
- d. delirijum

NEUROLOGIJA

1. **Pojačan osećaj mirisa naziva se hiperosmija:**
 - a. da
 - b. ne

2. **Edem (staza) papile n. optici znači povišen intrakranijalni pritisak:**
 - a. da
 - b. ne

3. **Znaci paralize očnih mišića su: strabizam, diplopije, paretični nistagmus, ptoza:**
 - a. da
 - b. ne

4. **Nabrojte dva refleksa za ispitivanje funkcije n. trigeminus-a:**

5. **Osećaj bola ispituje se tako što od pacijenta tražimo da razlikuje oštro od tupog:**
 - a. da
 - b. ne

6. **Senzitivna funkcija n. facialis odgovorna je za ukus prednje dve trećine jezika:**
 - a. da
 - b. ne

7. **N. accessorius je motorni nerv:**
 - a. da
 - b. ne

8. **N. hypoglossus je motorni nerv jezika:**
 - a. da
 - b. ne

9. **Osnovni simptom neuralgije n. trigeminus-a jeste:**

10. Koji se lek koristi u lečenju neuralgije n. trigeminus-a?

11. Koja je grana n. trigeminus-a najčešće zastupljena u neuralgiji n. trigeminus-a?

12. Nabrojte nekoliko antiepileptika:

13. Nabrojte nekoliko oblika epilepsije:

14. Hemorakička cerebrovaskularna oboljenja su: epiduralna, subduralna, subarahnoidalna, intracerebralna:

- a. da
- b. ne

15. Penubra je prostor oko infarkta u moždanom parenhimu:

- a. da
- b. ne

**16. Febrilne konvulzije se
(zaokruži tačan odgovor):**

- a. ne smatraju epilepsijom
- b. smatraju se epilepsijom

17. Nabrojte bar tri aktivnosti u okviru prve pomoći kod epileptičnog napada:

18.13. Koji je prvi lek koji i.v. dajemo kod epileptičnog statusa?

**19.14. Kod neuralgije n. trigeminusa, bol je najčešće lokalizovan u zoni
(zaokruži tačan**

20. odgovor):

II ili III grane

I grane

21. Terapija neuralgije n. trigeminusa obuhvata primenu (zaokruži tačan odgovor):

cerbamazepina

penicilina

22. Epiduralno krvarenje je (zaokruži tačan odgovor):

arterijsko

vensko

23. najčešći uzrok subarahnoidalnog krvarenja je (zaokruži tačan odgovor):

arterioskleroza sa hipertenzijom

hipotenzija

24. N. trigeminus je (zaokruži tačan odgovor):

mešoviti nerv

motorni nerv

25. N. trigeminus inerviše (zaokruži tačan odgovor):

mastikatornu muskulaturu

mimičnu muskulaturu

26. Koja dva refleksa se ispituju pri pregledu n. trigeminusa?

27. Edem (staza) papile n. opticus je znak:

a. povišenog intrakranijalnog pritiska

b. oboljenja n. trigeminus

28. N. trigeminus sadrži:

a. senzitivna vlakna

b. motorna vlakna

c. obe vrste vlakana

29. Bellova paraliza n. facialis ima karakteristike:

- a. periferne
- b. centralne lezije n. facialis

30. Navedite dva razloga koji mogu isprovocirati epileptički napad:

- a. _____
- b. _____

31. Toničko-klonički epileptički napad sastoji se iz sledećih faza:

32. Nabrojte postupke prve pomoći kod epileptičkog napada:

33. Koja vrsta lekova se koristi kod svih oblika epilepsije?

34. Šta sve može izazvati bol kod neuralgije n. trigeminus?

35. Koje lekove koristimo kod neuralgije n. trigeminusa?

36. Nabrojte riziko faktore za nastanak cerebrovaskularnih insulta:

37. Edem (staza) papile n. opticus je znak (zaokruži tačan odgovor):

- a. povišenog intrakranijalnog pritiska
- b. sniženog intrakranijalnog pritiska

38. Kod periferne paralize n. VII pacijent ne može da (zaokruži tačne odgovore):

- a. zatvori oko
- b. podigne obrvu
- c. pokaže zube na strani oštećenja

39. Febrilne konvulzije su (zaokruži tačan odgovor):

- a. epilepsija
- b. nisu epilepsija

40. Kod starijih od 35 godina života, najčešći uzroci epilepsije su (zaokruži tačne odgovore):

- a. cerebrovaskularni insult
- b. tumori
- c. apstinencijalni alkoholni sindrom
- d. metabolički poremećaji

41. Koja tri leka koristimo za prekid epileptičkog statusa?

42. Kod neuralgije n. V bol je (zaokruži tačan odgovor):

- a. munjevit i jak
- b. postepeno se razvija, kontinuirano i dugo traje

43. Kod neuralgije n. IX bol je lokalizovan (zaokruži tačan odgovor):

- a. u korenu jezika, tonzila
- b. u oku

44. Terapija cerebrovaskularne ishemije usmerena je na penumbru (zaokruži tačan odgovor):

- a. da
- b. ne

45. Riziko faktori za nastanak cerebrovaskularnog insulta su:

- a. _____
- b. _____
- c. _____

46. Tumori mozga izazivaju (zaokruži tačne odgovore):

- a. epileptičke napade
- b. psihičke promene
- c. oduzetost

47. Karakteristike o[te'enaj gornjeg motornog neurona su (zaokružite tačne odgovore):

- a. Pojačani mišićni tetivni refleksi(hiperrefleksija)
- b. Prisustvo patoloških refleksa
- c. Hipotonija mišić

48. Hipertonija se javlja u dva oblika-navedi ih:

- a. _____
- b. _____

49. Bellova paraliza zahvata (zaokruži tačan odgovor):

- a. N. Facialis
- b. N. Trigemini.
- c. Okulogire (N.III,N,IV,N,VI)

50. Belova paraliza je (zaokruži tačana odgovor):

- a. Periferna lezija
- b. Centralna lezija

51. Da li lokalano davanje anestetika kod stomatoloških inetravencija može da pogorša miastenične sindrome:

- a. DA

52. Koji deo lica je oduzet kod centralne lezije N. Facialis-a

53. Navedi bar tri tipa nevoljnih pokreta:

- a.
- b.

c.

54. Intermitentni, ponavljani, kratiki napadi intenzivnih unilatrelanih glavobolja koje se po pravili javljaju iznad istog orbitotemporalnog regiona uz istostranu nazalnu kongestiju, suženje, hiperemiju konjunktiva s iste strane je (zaokruži tačana odgovor):

- a. Klaster glavobolja
- b. Tipična migrena
- c.

55. Šta može da provocira migrenski napad?

56. Navedi osnovnu podelu senzibiliteta

57. Demijelinizacione lezije u CNS-u su karakteritsika (zaokruži tačan odgovor):

- a. Multiple skleroze
- b. Parkinsonove bolesti
- c. Alchajmerove bolesti

58. Navedi tri osnovne kliničke karakteristike Parkinsonove bolesti:

- a.
- b.
- c.

59. Šta je hemiplegija?

60. Ispad vida u jednj polovini vidnog polja naziva se

- a. Hemianopsija
- b. Amauroza
- c. kvadrantanopsija