

TEST IZ MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE

I. grupa pitanja

1. Sprečavanje asfiksije u okviru prve pomoći kod povreda lica i vilica podrazumeva:
2. Pravilan transportni položaj povredjenog sa povredama lica i vilica koji je u besvesnom stanju je:
3. Prelom zigomaticne kosti karakterisu sledeći simptomi i znaci:
4. Perkutana repozicija preloma zigomaticne kosti izvodi se pomoću:
5. Kod jednostranog preloma kondilarnog nastavka mandibule poremećaj okluzije karakterise:
6. Prelomi kondilarnog nastavka donje vilice dele se na:
7. Kao posledica nedijagnostikovanih, nelečenih ili neadekvatno lečenih preloma kondilarnog nastavka u ranom decijem uzrastu, može nastati:
8. Poremećaj okluzije u vidu totalno otvorenog zagrizaja nastaje kod preloma (*navesti vrstu preloma*):
9. Među rane komplikacije preloma zigomatične kosti spadaju:
10. Pružanje prve pomoći pri povredama lica i vilica podrazumeva:
11. Traumatska diplopija kod preloma zigomaticne kosti može nastati kao posledica:
12. Tipičan tip preloma donje vilice u decijem uzrastu je:
13. Vreme zarastanja preloma u dece prosečno traje:
14. Prelomi vilica u dece najčešće se imobilišu:
15. Kod tzv. povoljne linije preloma mandibule frakturna linija se pruža:
16. Kod tzv. nepovoljne linije preloma mandibule frakturna linija se pruža:
17. Suzenost i antimongoloidni položaj rimae oculi kod preloma zigomaticne kosti nastaje usled:
18. Ograničeno/onemogućeno otvaranje usta kod preloma jagodicne kosti nastaje usled:
19. Utrnulost obraza, nosnog krilca i gornje usne kod preloma jagodicne kosti nastaje usled:
20. Utrnulost gornjih zuba na strani preloma, kod preloma jagodicne kosti nastaje usled:
21. Za repoziciju preloma zigomaticne kosti od indirektnih pristupa koriste se:
22. Kod preloma zigomaticne kosti palpacijom se može ustanoviti stepenik na :

23. Za privremenu imobilizaciju maksilofacijalnih povreda najcesce se koriste:
24. Da bi nastupilo primarno zarastanje preloma kostani fragmenti moraju da budu:
25. Enoftalmus moze nastati kao komplikacija preloma:
26. Uticaj misicne vuce na dislokaciju fragmenata kod preloma gornje vilice je:
znacajan/nije znacajan
27. Kod jednostranog preloma koluma nadibule povredjeni nije u stanju da:
28. Guerin-ov znak se javlja kod preloma:
29. Guerin-ov znak karakterise:
30. Tipicna mesta za fiksaciju fragmenta kod preloma maksile Le Fort III su:
31. U kasne komplikacije preloma jagodicne kosti spadaju:
32. Primarno zarastanja preloma postize se posretstvom:
33. Za rtg dijagnostiku preloma zigomaticnih lukova se koriste:
34. Provizorno zbrinjavanje povreda mekih tkiva lica sastoji se iz:
35. Privremena hemostaza u maksilofacijalnom podrucju izvodi se pomocu:
36. Za horizontalno povezivanje fragmenata tela mandibule pomocu zicanih ligatura koristi se:
37. Za rtg dijagnostiku preloma poda orbite »blow-out« standardnom projekcijom se smatra:
38. Na rtg snimku kod preloma poda orbite »blow-out« vidi se:
39. Kod preloma Le Fort II instrumentalna repozicija fragmenata se izvodi pomocu:
40. Kod preloma Le Fort I za fiksaciju fragmenata u obzir dolaze:
42. Nesigurni znaci preloma donje vilice su:
43. Dislokacija fragmenata donje vilice po sirini oznacava se kao:
44. Za rtg dijagnostiku preloma maksile najveći značaj ima:
45. Prelom gornje vilice Le Fort II poznat je i kao:
46. Guerinov prelom je sinonim za prelom:
47. Prelomi zigomaticne kosti dele se na (Larsen i Thomsen, 1978):
48. Sigurni znaci preloma kostiju lica i vilica su:
49. Najčešće vrste dislokacije fragmenata donje vilice su:

50. Anestezija vise zuba i desni gornje vilice moze biti prisutna kod preloma:
51. Prelomi gornje vilice dele se na:
52. Prelom gornje vilice Le Fort III poznat je i kao:
53. Prelom gornje vilice Le Fort I poznat je i kao:
54. Privremena zicana imobilizacija kod koje jedna ligatura obuhvata po dva susedna zuba u vilici se zove:
55. Prelom Le Fort I karakterisu sledeci simptomi i znaci:
56. Klesta po Rowe-Killey-u se koriste za:
57. Za fiksaciju fragmenata pri hirurskom lecenju preloma bezubih vilica metod izbora predstavlja:
58. Kod jednostranog preloma kondilarnog nastavka mandibule poremećaj okluzije karakterise:
59. Kod tzv. nepovoljne linije preloma frakturna linija se pruza:
60. Za repoziciju preloma zigomaticne kosti od indirektnih pristupa koriste se:
61. Kod jednostranog preloma koluma mandibule povredjeni nije u stanju:
62. Prelom Le Fort II karakterisu sledeci simptomi i znaci:
63. Kasne komplikacije preloma gornje vilice su:
64. Uticaj misicne vuce na dislokaciju fragmenata kod transverzalnih preloma maksile je:
65. Dislokacija fragmenata kod transverzalnih preloma maksile najcesce je posledica:
66. Dislokacija srednjeg masiva lica kod preloma Le Fort III je (*navesti pravac*):
67. Za rtg dijagnostiku preloma zigomaticne kosti koriste se sledeci snimci:
68. Prelome srednjeg masiva lica Le Fort II ili III moze pratiti veoma obimno krvavljenje koje je posledica:
69. Kod krvavljenja usled preloma srednjeg masiva lica Le Fort III privremena hemostaza se vrsi:
70. Prva pomoc kod povreda lica i vilica na mestu povredjivanja se sastoji iz:
71. Povrede zigomatične kosti najčešće nastaju u:
72. Sigurni znaci preloma zigomatične kosti su:
73. Nesigurni znaci preloma kostiju lica su:

74. Urgentno lečenje kod obimnih povreda maksilofacijalne regije sastoji se od:
75. Kod preloma jagodicne kosti kao posledica povrede n. infraorbitalis-a nastace:
76. Dislokacija kondila kod jednostranog preloma kondilarnog nastavka najcesce je (pravac dislokacije):
77. Dislokacija kondila kod jednostranog preloma kondilarnog nastavka nastaje usled:
78. Najcesce kasne komplikacije preloma mandibule su:
79. Prelomi kostiju lica najcesce zarastaju _____ (a).
Takav nacin zarastanja karakterise _____ (b).
80. Krvavljenje na nos kod preloma zigomatične kosti je posledica:
_____ (a) .
Krv dospeva u nosnu duplju putem _____ (b).
Ovaj simptom se oznacava kao _____ (c).
81. Navesti latinske nazive za sledece pojmove koji se koriste u traumatologiji:
a) Nagnjecina: _____
b) Oguljotina: _____
c) Ujedna rana od psa: _____
d) Ujedna rana od coveka: _____
e) Rana nanesena vatrenim oruzjem: _____
f) Sekotina: _____
82. Ako kod preloma zglobnog nastavka u dece postoji poremećaj okluzije lecenje podrazumeva:
83. Kod preloma zigomaticne kosti palpacijom se moze ustanoviti stepenik na :
84. Kod preloma zigomaticne kosti za palpaciju je nedostupna sutura:
85. Za privremenu imobilizaciju maksilofacijalnih povreda najcesce se koriste:
86. Zavoji se najcesce koriste za _____ imobilizaciju (a).
Najcesce se koriste (vrste zavoja) :
87. Rinolokvoreja se javlja kod preloma _____ (a)
Posledica je povrede _____ (b).
88. Enoftalmus moze nastati kao komplikacija preloma maksile Le Fort II:
tacno
netacno
89. Pravilan transportni polozej povredjenog (P) sa povredama lica i vilica je:
a) (P) svestan: _____
b) (P) bez svesti: _____
90. Privremena zicana imobilizacija kod koje jedna ligatura obuhvata po dva susedna zuba u vilici se zove:

91. Gilmer-ov metod je indikovano kod preloma:
92. Za rtg dijagnostiku preloma koluma mandibule standardnom projekcijom se smatra:
93. Na rtg snimku kod preloma poda orbite »blow-out«u tipicnim slucajevima vidi se _____ (a). Lokalizovan je na _____ (b). Ovaj rtg nalaz nije evidentan ako postoji _____ (c).
94. Kod preloma jagodicne kosti instrumentalna repozicija fragmenata se izvodi uz pomoc sledecih pristupa:
95. Kod preloma zigomaticne kosti suzenost i antimongoloidni polozej rimae occuli nastaju usled:
96. Dentalni trajektorijum je:
97. Hipersalivacija kod preloma donje vilice posledica je:
98. Deformacija donje trećine lica kod preloma donje vilice posledica je:
99. Krepitacije se manifestuju karakterističnim zvukom koji se javlja usled:
100. Na prednoj strani vrata donje vilice pripaja se:
101. Kod dvostrukih preloma postoji ____ fragmenta (a). To su: _____
_____ (b).
102. Centar zagrižaja kod dvostrukih preloma je najčešće pomeren prema:
103. Najčešći etiološki faktor preloma vilica kod dece su:
104. Merilo uspešne repozicije je:
105. Kod izolovanih preloma zigomatičnog luka dolazi do impresije fragmenata prema:
106. Tokom procesa zarastanja preloma posle koliko dana se formira tvrdi kalus:
107. Mijelogeni kalus se sastoji od:
108. Nepotpuni prelomi mogu biti:
109. Postfraktorni kondilarni sindrom je:
110. Dislocatio ad axim je:
111. Dislocatio ad longitudinem cum distractione je:
112. Dislocatio ad latus je:
113. Dislocatio ad longitudinem cum contractione je:
114. Kod luksacionh preloma položaj glava donje vilice je:
115. Simptom naočara se javlja kod _____ (a). Njegove karakteristike su: _____ (b).

116. Koji su osnovni uslovi koje imobilizaciono sredstvo mora da zadovolji:
117. Ako se za vreme primarnog zbrinjavanja laceracije parotidnog predela rana ne usije po slojevima nastace:
118. Kod prekida kontinuiteta Stenonovog kanala pri primarnom zbrinjavanju laceracije parotidnog predela treba pokušati sa:
119. Koji je period odlaganja definitivnog zbrinjavanja maksilofacijalnih povreda kod politraumatizovanih pacijenata:
120. Lečenje luksiranih zuba bez dislokacije podrazumeva njihovu imobilizaciju u trajanju: